

Vestnik ural'skoi meditsinskoj
akademicheskoi nauki



ВЕСТНИК
УРАЛЬСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ
НАУКИ



2 (53)
2015

Екатеринбург

Содержание

Клинический опыт

Конышев К.В., Бриллиант А.А., Сазонов С.В. Изменение экспрессии рецепторов к эстрогену клетками карциномы молочной железы при регионарном метастазировании 4

Общая патология и патологическая физиология

Бриллиант А.А., Сазонов С.В., Засадакевич Ю.М. Особенности васкуляризации ткани карциномы молочной железы 7

Методики

Бакуринских А.А., Ларионов Л.П., Мирсаев Т.Д., Жолудев С.Е., Хонина Т.Г., Шадрина Е.В., Иваненко М.В., Бакуринских Е.А., Бозданова Е.А., Сабирзянов Н.А., Бакуринских А.Б., Филиппова Е.В. Средство для фиксации съемных зубных протезов, профилактики и лечения поражений слизистой оболочки полости рта на основе кремнийтитанорганического глицерогидрогеля, содержащее бифидумбактерин и гидроксипатит 10

Мордовской Г.Г., Поникаровская И.В., Якушкина А.Ю., Путьрский В.П., Ямпольский В.А., Панов Г.В. Методы выделения микобактерий туберкулеза при санитарно-бактериологической оценке загрязненности воздуха и поверхностей противотуберкулезных учреждений 16

Иммунология, микробиология, генетика

Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., Каспарова А.Э., Мордовина И.И. Возбудители урогенитальных инфекций и состояние иммунного ответа во время беременности 19

Канцерогенная опасность в различных отраслях промышленности и объектах окружающей среды

Будкарь Л.Н., Обухова Т.Ю., Карпова Е.А., Газимова В.Г., Шмони-на О.Г., Астахова С.Г., Вenediktov Д.Л., Грибова Ю.В. Клинико-иммунологические параллели онкологической настороженности по результатам исследования онкомаркеров и факторов сосудисто-го роста у рабочих, экспонированных к фиброгенной пыли различ-ного состава 25

Горяев Д.В., Тихонова И.В., Федорев Р.В., Новикова И.И., Ерофе-ев Ю.В. Факторы риска в развитии онкологической заболеваемости населения Красноярского края 29

Грибова Ю.В., Бушуева Т.В., Рослая Н.А., Силантьева Е.А., Лаб-зова А.К., Шмоница О.Г. Оценка предикторов и маркеров злокаче-ственных новообразований легких у работников металлургическо-го предприятия 32

Гринберг Л.М., Мещерякова Е.Ю., Валамина И.Е., Момот О.А. Пылевые поражения органов дыхания непрофессиональной приро-ды по данным резекций при раке легкого 36

Гурвич В.Б., Кузьмин С.В., Кузьмина Е.А., Адриановский В.И., Коч-нева Н.И. Системный подход к оценке и управлению канцероген-ной опасностью субъектов хозяйственной деятельности на приме-ре Свердловской области 40

Гурвич В.Б., Кузьмин С.В., Липатов Г.Я., Адриановский В.И., Зеб-зеева Н.В., Береснева О.Ю., Бушуева Т.В., Рузаков В.О. Результаты оценки канцерогенной опасности с поэтапной реализацией ком-плекса санитарно-гигиенических и медико-профилактических ме-роприятий 43

Долгих О.В., Старкова К.Г., Кривцов А.В. Иммуногенетические маркеры экспозиции бенз(а)пирена у детей 47

Зезеева Н.В., Липатов Г.Я., Кузьмина Е.А., Русских К.Ю. Резуль-таты сравнительной оценки канцерогенных рисков у работающих при разных способах получения черновой меди 50

Ибраев С.А., Жарылкасын Ж.Ж., Отаров Е.Ж., Полторецкая Г.С., Калишев М.Г., Койгельдинова Ш.С., Джанабаев Д., Жакетае-ва Н.Т., Тилемисов М.К. Биохимические показатели при интерсти-циальном пневмофиброзе у работающих с хризотилом 53

Кашанский С.В. Динамика заболеваемости злокачественной мезо-телиомой плевры в Екатеринбурге за 50 лет 56

Корнilkov А.С., Привалова Л.И., Плотко Э.Г., Ярушин С.В., Лав-рентьев А.Н. Канцерогенный риск для здоровья населения в одном

Clinical Experience

Konyshev K.V., Brilliant A.A., Sazonov S.V. Change of estrogen receptor expression in breast cancer cells in locoregional metastases 4

The General Pathology and Pathological Physiology

Brilliant A.A., Sazonov S.V., Zasadkevich Y.M. Features of breast cancer tissue vascularization 7

Technique

Bakurinskikh A.A., Larionov L.P., Mirsaev T.D., Zholudev S.E., Khonina T.G., Shadrina E.V., Ivanenko M.V., Bakurinskikh E.A., Bogdanova E.A., Sabirzyanov N.A., Bakurinskikh A.B., Filipova E.V. Medicine for fixing dentures, prevention and treatment of lesions of the oral mucosa on the base of organosilicantitanium glycerohydrogel, containing bifidumbacterinum and hydroxyapatite 10

Mordovskoy G.G., Ponikarovskaya I.V., Yakushkina A.Y., Putyrskiy V.P., Yampolskiy V.A., Panov G.V. A method for isolation of mycobacterium tuberculosis in sanitary-bacteriological evaluation of contamination of air and surfaces of tb institutions 16

Immunology, Microbiology, Genetics

Belocerkovceva L.D., Kovalenko L.V., Kasparova A.E., Mordovina I.I. Urogenital infection and immune response during pregnancy 19

Carcinogenic Hazard in Different Branches of Industry and Background Objects

Budkar L.N., Obukhova T.Y., Karpova E.A., Gasimova V.G., Shmonina O.G., Astakhova S.G., Venediktov D.L., Gribova Y.V. Clinical and immunological parallels cancer awareness the results of the study of tumor markers and factors of vascular growth in patients at high risk of early development of complex pathology 25

Goryayev D.V., Tikhonova I.V., Fedoreyev R.V., Novikova L.L., Yerofeyev Yu.V. Risks in the cancer expansion in population of the Krasnoyarsk territory 29

Gribova Yu.V., Bushuyeva T.V., Roslaya N.A., Silantyeva Ye.A., Labzova A.K., Shmonina O.G. Assessment of the predictors and markers of malignant tumors in the lungs of metallurgical plant workers 32

Grinberg L.M., Meshcheryakova Ye.Yu., Valamina I.Ye., Momot O.A. Dust lung lesions of the non-occupational nature according to the results of resections by reason of lung cancer 36

Gurvich V.B., Kuzmin S.V., Kuzmina E.A., Adrianovskii V.I., Kochneva N.I. Systematic approach to the assessment and management of carcinogenic hazard of economic entities on an example of Sverdlovsk region 40

Gurvich V.B., Kuzmin S.V., Lipatov G.Y., Adrianovskii V.I., Zebzeeva N.V., Beresneva O.Y., Bushueva T.V., Ruzakov V.O. The results of the evaluation of carcinogenic hazard with a phased implementation of a set of sanitary and medical preventive measures in the context of copper smelting enterprises 43

Dolgikh O.V., Starkova K.G., Krivtsov A.V. Immunogenetic indicators of the exposure to benzo(a)pyrene in children 47

Zebzeeva N.V., Lipatov G.Y., Kuz'mina E.A., Russkikh K.Y. The results of the comparative evaluation of carcinogenic risks in workers employed in different ways of producing blister copper 50

Ibraev S.A., Zharylkassyn Zh.Zh., Otarov E.Zh., Poltoretskaya G.S., Kalishev M.G., Koygeldinova Sh.S., Janabayev D., Zhaketaeva N.T., Tilemisov M.K. Biochemical indicators interstitial fibrosis in workers exposed to chrysotile 53

Kashanskiy S.V. The dynamics of the malignant pleural mesothelioma morbidity in ekaterinburg city for the period 1956-2004 56

Kornilkov A.S., Privalova L.I., Plotko E.G., Yarushin S.V., Lavrentiev A.N. A carcinogenic health risk assessment for the population of the industrial hub in the Sverdlovsk region 56

Долгих О. В., Старкова К. Г., Кривцов А. В.

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭКСПОЗИЦИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА У ДЕТЕЙ

ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»;

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,

г. Пермь, Российская Федерация;

Резюме. Представлены результаты исследований особенностей распределения частот генов CYP1A1, TNFальфа, PT53, MMP9 у детей в условиях экспозиции бенз(а)пиреном. Выявлены особенности генетического полиморфизма генов, а также их ассоциация с контаминацией биосред химическими канцерогенами и специфическим иммунологическим ответом на гаптен. Выявлена вариабельная аллельность иммунокомпетентных генов и гена детоксикации преимущественно за счет частот гетерозиготных аллельных вариантов.

Ключевые слова: ген транскрипционного фактора p53, фактор некроза опухоли, IgG к бенз(а)пирену

Вследствие генетической гетерогенности популяции человека в ней присутствуют индивиды, генетические особенности которых обуславливают повышенную чувствительность к действию химических веществ, обладающих свойствами канцерогенов. Восприимчивость организма к воздействию техногенных химических факторов в значительной мере зависит от функциональных особенностей и генетических ассоциаций, определяющих состояние белков, отвечающих за детоксикацию, интенсивность и последовательность процессов апоптоза и активности состояния компонентов иммунного ответа, участвующих в реализации этого процесса [1–10]. К ключевым полиморфизмам, определяющим взаимодействие факторов окружающей среды и процессов иммунологического гомеостаза, относятся полиморфизмы генов цитохрома CYP1A1, транскрипционного фактора p53, фактора некроза опухоли альфа (TNFальфа) и металлопротеиназы [11, 12, 13]. Первая фаза дезактивации обеспечивается, главным образом, суперсемейством цитохрома P-450 (CYP). Их основные функции заключаются в присоединении к молекуле ксенобиотика гидрофильных групп, благодаря чему происходит детоксикация. CYP1A1 кодирует фермент арилуглеводородкарбоксилуазу, который участвует в метаболизме эстрогенов, некоторых лекарственных средств и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — основных компонентов табачного дыма и продуктов сжигания органического топлива. Этот фермент контролирует начальный метаболизм ПАУ и ряда других органических соединений, приводящий к образованию канцерогенов (например, бенз(а)пирена) [14]. Продукт гена TNFальфа — фактор некроза опухоли альфа (TNF-альфа, кахектин) — относится к цитокиновой системе и представляет собой клеточный медиатор макрофагов и лимфоцитов, играет важную роль в регуляции процессов дифференцировки, роста и метаболизма клеток, является медиатором воспалительных процессов, инициирует образование свободных радикалов и может способствовать развитию оксидативного стресса. Полиморфизм каждого из сайтов промоторной области гена TNFA снижали активность гена-репортера примерно в два раза. Ген p53 — онкосупрессор, его продукт белок p53 контролирует ответ клетки на различные виды стресса, включая повреждение ДНК химическими и физическими агентами, нарушения микротрубочек цитоскелета, активацию онкогенов, гипоксию, гипертермию и др. Активация гена p53 ведет к остановке пролиферации клетки и к включению в ней программы апоптоза — запрограммированной клеточной гибели. Металлопротеиназа MMP9 относится к семейству внеклеточных цинк-зависимых эндопептидаз, способных разрушать все

типы белков внеклеточного матрикса; играет роль в ремоделировании тканей, ангиогенезе, пролиферации, миграции и дифференциации клеток, апоптозе, сдерживании роста опухолей; задействована в расщеплении мембранных рецепторов, выбросе апоптозных лигандов, таких как FAS, а также в активации и деактивации хемокинов и цитокинов.

Цель работы — анализ иммунологических и генетических маркеров у детского населения в условиях техногенного загрязнения среды обитания бенз(а)пиреном.

Материалы и методы

Проводили углубленное изучение состояния здоровья детского населения в возрасте от 3 до 7 лет, посещающего детские дошкольные учреждения в крупном промышленном центре. Ведущим фактором аэрогенной внешнесредовой нагрузки выступал бенз(а)пирен. Обследованы 90 детей (группа наблюдения), при этом группу сравнения составили 80 детей с условно-чистой территории с допустимым уровнем химического воздействия.

Содержание органических соединений в биосредах определяли с помощью высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии. Показатели гиперчувствительности (содержание IgG специфического к бенз(а)пирену) изучали методом аллергосорбентного тестирования. Медиаторы межклеточной иммунной регуляции (IL-10, IL-17, TNF-альфа), маркер эндотелиальной дисфункции VEGF, IgE общий идентифицировали в процессе иммуноферментного анализа. Забор материала для ПЦР проводили методом взятия мазков со слизистой оболочки ротоглотки. Для определения генотипов использовали вариант ПЦР в режиме реального времени и метод аллельной дискриминации. В ходе исследования проведено изучение полиморфизма шести патогномичных генов — CYP1A1, TNFальфа, PT53, MMP9.

Результаты и их обсуждение

Натурные исследования качественного состава атмосферного воздуха показали, что его состояние не соответствует установленным гигиеническим нормативам. Дети, проживающие в анализируемом районе, находятся под воздействием бенз(а)пирена в условиях превышения нормативных концентраций — до 1,9 ПДКс.с.

Анализ полученных концентраций органических соединений в крови детей группы наблюдения показало наличие достоверного превышения концентрации бенз(а)пирена в крови детей в 1,6 раза ($p < 0,05$) над его содержанием в крови детей, проживающих на территории сравнения.

Анализ заболеваемости населения, проживающего в исследуемых районах, проводился по классу болезней врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения. Зафиксированы достоверно более высокие показатели распространенности заболеваний в группе наблюдения (20,0 на 1000 населения) по отношению к группе сравнения (10,0 на 1000 населения).

Анализ отношения шансов изменения показателей гуморального иммунитета при возрастании концентрации контаминантов в биологических средах позволил установить достоверное ($p < 0,05$) повышение концентрации IgG при увеличении концентрации в крови бенз(а)пирена ($R2 = 0,92$ при $p < 0,05$).

Наблюдаются достоверные отклонения уровня общей сенсibilизации как в сравнении с возрастной нормой (содержание IgE общего — 114,6 ± 34,70 МЕ/мл при норме <50,0) (p < 0,05), так и с группой контроля. Достоверно увеличивается шанс возрастания IgE общего при повышении концентрации бенз(а)пирена — R2 = 0,74 при p < 0,05.

Выявлено достоверное снижение васкулярного эндотелиального фактора роста в сравнении с контрольным уровнем, p < 0,05. Наблюдались отклонения регуляторных показателей по отношению к группе сравнения, в частности, достоверно повышен уровень содержания медиаторов межклеточной иммунной регуляции (IL-17). Одновременно отмечалось достоверное снижение концентрации TNF-альфа у обследованных в среднем в 2 раза относительно группы сравнения (p < 0,05).

Установлен достоверно повышенный по сравнению с референтными значениями уровень специфической сенсibilизации к бенз(а)пирену по критерию IgG, достоверный по кратностям превышения нормы (кратность превышения нормы составила по IgG к бенз(а)пирену в 1,5 раза) (p < 0,05), а также относительно группы сравнения в 2,0 раза (p < 0,05).

Анализ отношения шансов изменения специфического ответа при возрастании концентрации контаминантов в крови позволил установить достоверное (p < 0,05) повышение концентрации IgG к бенз(а)пирену при увеличении концентрации бенз(а)пирена в крови (R2 = 0,73 при p < 0,05).

Генетический анализ выявил особенности полиморфизма приоритетных генов, участвующих в процессах адаптации к измененным условиям среды (Таблица 1).

Так, у детей группы наблюдения ген фермента детоксикации ксенобиотиков CYP1A1 отличался повышенной в 5,3 раза частотой минорного аллеля за счет гетерозиготных генотипов. Аллельный полиморфизм гена, отвечающего за иммунный ответ и апоптоз — TNFальфа — также характеризовался повышенной (в 1,3 раза) распространенностью у детей группы наблюдения за счет гетерозиготного варианта. Вариантный аллель гена транскрипционного фактора в основной группе достоверно наблюдался в 2,2 раза чаще группы сравнения. Анализ распространенности мутантного аллеля гена металлопротеиназы показал возрастание в 2,7 раза частоты минорного гомозиготного генотипа гена MMP9 в анализируемой группе по отношению к группе сравнения.

Таблица 1

Результаты генотипирования, дети, %

Ген/Аллель	CYP1A1		PT53		TNF		MMP9	
Группа наблюдения	GG	88	CC	40	GG	72	AA	28
	GA	12	CG	46	GA	28	AG	56
	AA	0	GG	14	AA	0	GG	16
	G	94	C	63	G	86	A	56
	A	16	G	37	A	14	G	44
Группа сравнения	GG	93	CC	66	GG	79	AA	60
	GA	7	CG	33	GA	21	AG	34
	AA	0	GG	1	AA	0	GG	6
	G	97	C	83	G	89	A	77
	A	3	G	17	A	11	G	23

Выводы

1. В результате обследования детского населения крупного промышленного центра, проживающего в условиях загрязнения среды обитания бенз(а)пиреном, выявлены существенные изменения функциональных показателей иммунной системы: повышение специфической чувствительности к компонентам факторной нагрузки организма (IgG к бенз(а)пирену); изменение уровня медиаторов им-

мунной регуляции TNF-альфа, ИЛ-17 (p < 0,05).

2. Показанные нарушения дополняются особенностями генетического полиморфизма с преимущественной распространенностью минорного аллеля генов цитохрома, фактора некроза опухоли, транскрипционного фактора и металлопротеиназы. При этом бенз(а)пирен выступает ведущим показателем факторной нагрузки, достоверно влияя на иммунный статус обследованных детей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Долгих О.В., Зайцева Н.В., Дианова Д.Г., Вдовина Н.А. Оценка иммунного статуса женщин, работающих в условиях воздействия бенз(а)пирена. Академический журнал Западной Сибири. 2013; 6(49): 105-106.
2. Долгих О.В., Зайцева Н.В., Дианова Д.Г., Лыхина Т.С., Кривцов А.В., Гугович А.М. Регуляция цитокинового профиля у работающих в условиях вредного производства. Цитокины и Воспаление. 2010; 9(3): 45-46.
3. Долгих О.В., Зайцева Н.В., Дианова Д.Г., Харахорина Р.А. Особенности апоптоза в условиях экспозиции хлорорганических соединений и ванадия. Гигиена и санитария. 2012; 3: 15-17.
4. Зайцева Н.В., Долгих О.В., Предеина Р.А. и соавт. Полиморфизм генов и особенности иммунной регуляции у работающих в условиях металлургического производства. Здоровье семьи – 21 век. 2013; 4(4): 27-39.
5. Измеров Н.Ф. Профессиональный отбор в медицине труда. Мед. труда и пром. экология. 2006; 3: 1-5.
6. Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Иванов С.И. Современные научные проблемы совершенствования методологии оценки риска здоровью населения. Гигиена и санитария. 2005; 2: 3-8.
7. Dolgikh O.V., Kharakhorina R.A., Dianova D.G., Gugovich A.M. State of cell regulation in children exposed to phenols. Proceedings of the 3rd International Academic Conference «Applied and Fundamental Studies»; 2013 Aug 30v31; St. Louis, Missouri, USA; 2013.
8. Dolgikh O., Zaitseva N., Dianova D., Krivtsov A. Molecular markers of apoptosis in industrial workers. In vivo: International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research. 2011; 25(3): 523-524.
9. Descotes J., Nicolas B., Vial T. Assessment of immunotoxic effects in humans. Clin. Chem. 1995; 41(12): 1870-1873.
10. Descotes J., Vial Th. Immunotoxic effects of xenobiotics in humans: A review of current evidence. Toxicol. in Vitro. 1994; 8(5): 963-966.
11. Долгих О.В., Кривцов А.В., Дианова Д.Г., Гугович А.М., Харахорина Р.А. Полиморфизм гена фактора некроза опухоли и гена СРОХ у работающих в условиях химического производства. Мед. труда и пром. экология. 2011; 11: 29-32.
12. Долгих О.В., Гугович А.М., Кривцов А.В. Иммуногенетические маркеры пролиферативных реакций в условиях экспозиции бензолом и формальдегидом. Рос. иммун. журнал. 2013; 7(16): 196.
13. Долгих О.В., Бубнова О.А., Данилова Е.Д. и соавт. Полиморфизм генов белков ангиогенеза в условиях шумовой и химической техногенной экспозиции. Здоровье населения и среда обитания. 2013; 11(248): 42-44.
14. Куценко С.А. Основы токсикологии. СПб.: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 2002.

Авторская справка

Долгих Олег Владимирович

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

д. м. н., профессор кафедры экологии человека и безопасности жизнедеятельности

ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», г. Пермь

заведующий отделом иммунобиологических методов диагностики
Российская Федерация, 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82

Старкова Ксения Геннадьевна
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», г. Пермь.
к. б. н., заведующий лабораторией иммунологии и аллергологии ФБУН
Российская Федерация, 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82

Кривцов Александр Владимирович
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», г. Пермь
к. м. н., заведующий лабораторией иммуногенетики
Российская Федерация, 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82

Dolgikh O. V., Starkova K. G., Krivtsov A. V.
**IMMUNOGENETIC INDICATORS OF
THE EXPOSURE TO BENZO(A)PYRENE
IN CHILDREN**

Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health
Risk Management Technologies, Perm, Russian Federation;
Perm State National Research University, Perm, Russian
Federation

Abstract. This study describes the characteristics of frequencies' distribution of cytochrome genes, TNF α , PT53 and MMP9 genes in children under the conditions of exposure to benzo(a)pyrene. Specific features of the genetic polymorphism and the genes association accompanied by the biological media contamination with a chemical mutagen and the specific immunological response to the hapten were found. The variable allelism of the detoxification gene and the immunocompetent genes was revealed owing to the frequency of heterozygous allelic variants.

Key words: gene of the transcription factor p53, tumor necrosis factor, IgG to benzo(a)pyrene

REFERENCES

1. Dolgih O.V., Zajceva N.V., Dianova D.G., Vdovina N.A. Ocenka immunnogo statusa zhenshin, rabotajushhih v usloviyah vozdeystvija benz(a)pirena. Akademicheskij zhurnal Zapadnoj Sibiri. 2013; 6(49): 105-106.
2. Dolgih O.V., Zajceva N.V., Dianova D.G., Lyhina T.S., Krivcov A.V., Gugovich A.M. Reguljacija citokinovogo profilja u rabotajushhih v usloviyah vrednogo proizvodstva. Citokiny i Vospalenie. 2010; 9(3): 45-46.
3. Dolgih O.V., Zajceva N.V., Dianova D.G., Harahorina R.A. Osobennosti apoptoza v usloviyah jekspozicii hlororganicheskikh soedinenij i vanadija. Gigiena i sanitarija. 2012; 3: 15-17.
4. Zajceva N.V., Dolgih O.V., Predeina R.A. i soavt. Polimorfizm genov i osobennosti immunnogo reguljacie u rabotajushhih v usloviyah metallurgicheskogo proizvodstva. Zdorov'e sem'i – 21 vek. 2013; 4(4): 27-39.
5. Izmerov N.F. Professional'nyj otbor v medicene truda. Med. truda i prom. jekologija. 2006; 3: 1-5.
6. Rahmanin Ju.A., Novikov S.M., Ivanov S.I. Sovremennye nauchnye problemy sovershenstvovanija metodologii ocenki riska zdorov'ju naselenija. Gigiena i sanitarija. 2005; 2: 3-8.
7. Dolgikh O.V., Kharahorina R.A., Dianova D.G., Gugovich A.M. State of cell regulation in children exposed to phenols. Proceedings of the 3rd International Academic Conference «Applied and Fundamental Studies»; 2013 Aug 30v31; St. Louis, Missouri, USA; 2013.
8. Dolgikh O., Zaitseva N., Dianova D., Krivtsov A. Molecular markers of apoptosis in industrial workers. In vivo: International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research. 2011; 25(3): 523-524.
9. Descotes J., Nicolas B., Vial T. Assessment of immunotoxic effects in humans. Clin. Chem. 1995; 41(12): 1870-1873.
10. Descotes J., Vial Th. Immunotoxic effects of xenobiotics in

humans: A review of current evidence. Toxicol. in Vitro. 1994; 8(5): 963-966.

11. Dolgih O.V., Krivcov A.V., Dianova D.G., Gugovich A.M., Harahorina R.A. Polimorfizm gena faktora nekroza opuholi i gena SROH u rabotajushhih v usloviyah himicheskogo proizvodstva. Med. truda i prom. jekologija. 2011; 11: 29-32.

12. Dolgih O.V., Gugovich A.M., Krivcov A.V. Immunogeneticheskie markery proliferativnyh reakcij v usloviyah jekspozicii benzolom i formal'degidom. Ros. immun. zhurnal. 2013; 7(16): 196.

13. Dolgih O.V., Bubnova O.A., Danilova E.D. i soavt. Polimorfizm genov belkov angiogeneza v usloviyah shumovoj i himicheskoy tehnogennoj jekspozicii. Zdorov'e naselenija i sreda obitanija. 2013; 11(248): 42-44.

14. Kucenko S.A. Osnovy toksikologii. SPb.: Voenno-meditsinskaja akademija im. S.M. Kirova, 2002.

Authors

Dolgikh Oleg V.

Perm State National Research University

MD, Professor of Human Ecology and Life Safety Department

Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies

Head of Immunobiological Diagnostics Department

Monastyrskaya St., 82, 614045 Perm, Russian Federation

oleg@fcrisk.ru

Starkova Kseniya G.

Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies

PhD, Head of Allergy and Immunology Laboratory

Monastyrskaya St., 82, 614045 Perm, Russian Federation

Krivtsov Aleksandr V.

Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies

PhD, Head of Immunogenetics Laboratory

Monastyrskaya St., 82, 614045 Perm, Russian Federation